



Centre Hospitalier Territorial - Nouméa

Les infections génitales hautes: une histoire hospitalière et extrahospitalière



Les Infections génitales hautes

- Problème de santé publique en Nouvelle Calédonie
- Environ 80 hospitalisations en urgence /an
- Impact considérable sur ces femmes jeunes
- La gravité de la maladie impose des hospitalisations avec des antibiothérapies à large spectre
- Puis une prise en charge post hospitalière rapprochée

Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation
- Traitement médical parentéral probabiliste
- Surveillance

Constats. Historique.

- Préoccupations convergentes du Dr CAMUS et d'ESPAS
- Peu et même pas de données fiables sur les IGH (nombre, issue de traitement, venue des partenaires)
- Volonté commune d'unir nos efforts et nos compétences pour améliorer la prise en charge des IGH et éviter les recontaminations..

OBJECTIFS

Objectifs principaux:

- ✓ Améliorer l'observance
- ✓ Améliorer le suivi (consultations de contrôle)
- ✓ Traiter le(s) partenaire(s)

Objectifs secondaires:

- ✓ Recueil de données
- ✓ Amélioration de la communication sur la sexualité et les IST
- ✓ Échange de pratiques, formalisation, amélioration des protocoles

Evaluation

- Début du partenariat : juillet 2010
- Nombre de personnes hospitalisées
- Age
- Nombre de personnes ayant achevé leur traitement
- Nombre de partenaires vus
- Retour en consultation

Evaluation des résultats(1)

1^{er} juillet 2010-30 avril 2012

| | < 20 ans | 20-29 ans | 30-39 ans | > 40 ans | Total |
|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2010 (1/2 Année) | 10 | 18 | 5 | 8 | 41 |
| 2011 | 13 | 30 | 25 | 9 | 77 |
| 2012 (4 mois) | 4 | 8 | 8 | 5 | 25 |

Les résultats (2)

| | Traitement débuté | Traitement achevé |
|------|-------------------|-------------------|
| 2010 | 35/41 (85%) | 30 (73%) |
| 2011 | 72/77 (93%) | 62 (81%) |
| 2012 | 24/26 (92%) | 23 (88%) |

Les résultats (3)

| | Partenaires à voir | Partenaires vus |
|------|--------------------|-------------------|
| 2010 | 43 | 20 (46,5%) |
| 2011 | 77 | 42 (54,5%) |
| 2012 | 23 | 18 (78%) |

| Rv. Gynéco | fixés | honorés | Non honorés | Non renseignés |
|------------|-------|-----------|-------------|----------------|
| 2010 | 15 | 10 (66%) | 3 | 2 |
| 2011 | 36 | 29 (80%) | 7 | |
| 2012 | 22 | 14 (63%) | 6 | 2 |

Prise en charge post hospitalisation à ESPAS

- Visite de santé publique
- Suivi du traitement
- Rendu des résultats
- Prise en charge du ou des partenaires
- Motive la consultation chez un gynéco en fin de traitement

A yellow-tinted photograph of a person's face in a crowd. A large red circle is drawn around a specific area on the forehead, likely indicating a point of interest or a specific feature being discussed. The text "Pour éviter ça..." is overlaid in the center of the image.

Pour éviter ça...

Hydrosalpinx



Hydrosalpinx



Hydrosalpinx bilatéral



Pour éviter ça

- La recherche active
- L'approche syndromique

La recherche active: 1 seule question

Lors de toute consultation de médecine générale pour quelque raison que ce soit:

« Avez-vous des signes qui vous inquiètent au niveau du sexe, bobos, pertes, brûlures urinaires, petites verrues? »

Qu'est ce que l'approche syndromique?

- Diagnostic et traitement immédiat
- Information personnalisée du patient
- Traitement et information personnalisée du ou des partenaires
- Cibler les groupes vulnérables

Conclusion

- Partenariat efficace et faisable
- Perspectives: extension dans le Nord
- Mais les IST sont l'affaire de tous!